



DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE NEL BAMBINO FINO A UN ANNO DI ETÀ



Vademecum per genitori e addetti al primo soccorso e alle emergenze negli asili nido

Tosse efficace

In caso di sospetta ostruzione parziale



Se il bambino respira, tossisce o emette suoni, **evitare qualsiasi manovra**. Valutare il bambino in modo continuo compresa l'efficacia della tosse.

Tosse inefficace

In caso di sospetta ostruzione completa



Se il bambino è cosciente **effettuare le seguenti manovre**:

Pacche interscapolari

- Mettere il bambino prono sull'avambraccio.
- Mantenere la testa in leggera estensione e più in basso rispetto al tronco.
- Appoggiare l'avambraccio sulla coscia.
- Dare 5 vigorosi colpi tra le scapole.



Compressioni toraciche

- Mettere il bambino supino sull'avambraccio o su un piano rigido.
- Cercare il terzo inferiore dello sterno.
- Eseguire 5 vigorose compressioni toraciche, circa 1 ogni 3 secondi.



Alternare le due manovre fino alla risoluzione della ostruzione completa

In caso il bambino non sia cosciente



- **Chiamare il soccorso sanitario 118.**
- Posizionare il bambino supino su un piano rigido.
- Effettuare la rianimazione cardiopolmonare di base.

